

Cuadro de Dosis

CULTIVOS	Objetivo	Momentos de Aplicación	DOSIS aplicación foliar	
Uva de mesa	Palo de Negro	Preventivo	Crecimiento de bayas	1 – 1.5 L
		Preventivo	Inicio de pinta	1 – 1.5 L
		Curativo	Inicio de pinta	1 – 1.5 L
	Mejorar condición de postcosecha. Fruta de guarda	2 a 3 aplicaciones: -10 días antes de cosecha. -8 días después. -Después del primer floreo de cosecha (optativo).		1 – 1.5 L
Arándano	Mejorar firmeza de los frutos. Aumentar resistencia a la manipulación.	-Post cuaja	-Crecimiento de frutos a inicio de pinta.	1 – 1.5 L
Frambuesa	Mejorar condición de postcosecha.			
Sandia Melón	Acelerar y mejorar el engrosamiento del fruto. Previene deshidratación prematura.	-Desde fruto de 5 a 8 cm. -Repetir 10 y 20 días después.		
Tomate	Prevenir la deshidratación foliar y pudrición apical del fruto. Mejorar firmeza del fruto	-Frutos de 5 a 8 cm. -Repetir a los 10-15 días.		
Pimiento				
Berenjena Capsicum				
Zapallo italiano	Mejorar engorde de frutos.	-Desde fruto cuajado, 3-4 aplicación cada 15 días.		
Fresa	Mejorar la consistencia del fruto y disminuir susceptibilidad a pudriciones.	-Desde fruto cuajado, 3-4 aplicaciones cada 15 días.		1 – 1.5 L
Hortalizas de hoja	Corregir la deshidratación del margen foliar y del cuello de la hoja.	-Al aparecer los primeros síntomas. -Repetir 8 días después. -Precosecha		
Apio	Corregir el corazón negro y agrietamiento del peciolo.	-Con 3 a 4 hojas verdaderas -Repetir 10 15 días después.		
Aroz	Mejorar rendimiento y calidad molinera.	Aplicar en punto de algodón o inicio de floración y la segunda aplic. 15 días después o inicio del espigado.		1 L
Mango	Mejorar el rendimiento y calidad de la fruta.	Mejorar el rendimiento y calidad de la fruta.		1 – 2 L



AGITAR ANTES DE USAR

Contenido Neto: 1L 5L 20L

CalciBor K-Mg

Mejora la calidad de tus cosechas



Distribuidor por:

SANTA CLARA
Agroinsumos

Cultivando rentabilidad...!

Correo: ventas@agroinsc.com

CalciBor K-Mg

Mejora la calidad de tus cosechas

CalciBor K-Mg, es un fertilizante de elevada concentración y pureza, que resuelve varios desórdenes manifestados por la deshidratación y necrosis debidas a carencias de calcio, potasio, magnesio y/o boro.

CalciBor K-Mg, posee en su composición calcio complejoado con aminoácidos que facilita su absorción y permite lograr resultados óptimos. aumenta la resistencia a los ataques de Botrytis cinerea, mejora la turgencia celular y la conservación, incluso durante el transporte a larga distancia.

CalciBor K-Mg, puede ser aplicado en todos los cultivos y se recomienda utilizar el producto cuando existan carencias nutricionales, en la etapa de llenado y antes de la cosecha.

Beneficios

- Frutos más firmes
- Mejor color
- Mayor textura
- Previene la deshidratación del raquis
- Necrosis apical y ablandamiento prematuro de los frutos
- Mayor vida en percha
- Previene el ataque de enfermedades

Composición Química

Tamaño de la Porción al 100%

Calcio (CaO)	10% p/v
Potasio (K2O)	5% p/v
Magnesio (MgO)	2% p/v
Boro (B)	0.1 % p/v
Aminoácidos	10 % p/v
Vitaminas	0.025 % p/v

Distribuidor por:

Santa Clara Fruits EIRL

Dirección: Jr. Suya 299. Tamba Grande, Sullana - Piura
RUC: 20526533551

Correo: ventas@agroinsc.com

Formulado por Laboratorio Fito Nutricional SAC

Correo: dluciano@bionut.com.pe

Recomendaciones Importantes:

Agitar el envase antes de abrir.

No utilizar los envases después de la aplicación.

Después de la aplicación, bañarse con abundante agua y jabón.