

GENERALIDADES:

Fosforo-Zn, Contiene fósforo que interviene principalmente en los procesos energéticos y reproductivos, mientras que el zinc es el principal activador enzimático en los vegetales, además de participar en la síntesis de fitohormonas, promoviendo la producción de fitoalexinas y estimulando así los mecanismos de defensa de la planta, produciendo así un fortalecimiento en los tejidos

Fosforo-Zn, Es un fertilizante foliar con alto contenido en Fósforo y Zinc, 100% solubles,

Fosforo-Zn, Es una formulación única que permite ser absorbido rápidamente por el follaje, para posteriormente traslocarse acropétala y basipétalmente.

Fosforo-Zn, Es un producto desarrollado para la prevención y corrección de carencias de Zinc, que además actúa como activador de las plantas, favorece el desarrollo radicular y mejora los procesos de floración, cuajado y maduración de los frutos.

Fosforo-Zn, Tiene acción sistémica, se absorbe rápidamente y se distribuye a todas las partes de la planta.

Fosforo-Zn, La riqueza de Fósforo y Zinc favorece la migración de azúcares hacia los frutos

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas, excepto con dimetoato, aceites, productos cúpricos y Calcio. Para la aplicación con Fitosanitarios hacer unas pruebas pequeñas de compatibilidad.

ADVERTENCIA DE USO:

La empresa no se responsabiliza por el mal uso del producto así como por otros factores (preparación de las mezclas, aplicación, climatología, etc) que escapen de nuestro control que puedan intervenir en los malos resultados, siendo el usuario el responsable.

FOSFORO-Zn

FÓSFORO+ ZINC

USO DESPUÉS DE PODA, BROTE VEGETATIVO Y FRUCTIFICACIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA	p/v
Fósforo	30.00 %
Zinc	10.00 %
Magnesio	10.00 %
Aminoácidos	30.00 %

Formulado por:



Distribuido por:



Contenido Neto: 1Lt

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS L x 200 L	DOSIS L x ha	MOMENTO DE LA APLICACIÓN
Palto, Naranja, Mandarina, Limón Sutil, Limón Tahití.	1	3 - 4	Desde fines del verano, repetir cada 20 días.
Arándano, Cereza.	1	2 - 3	En Postcosecha temprana, repetir a los 20 días.
Vid y Kiwi.	1	2 - 3	Desde Prefloración, repetir cada 15 a 20 días.
Manzana y Pera.	1	2 - 3	En Prefloración, cuajado y desarrollo de frutos.
Durazno, Cereza, Ciruela, Alendras.	1	2 - 3	En Postcosecha temprana, repetir a los 20 días.
Tomate, Cebolla, Papa, Pimiento, Melón, Sandía, Zapallo, Ajo, Apio, Lechuga, Brócoli, Coliflor, Espinaca.	1	2 - 3	Aplicar durante el desarrollo del cultivo, repetir cada 15 a 20 días.
Mango.	1	3 - 4	Aplicar después de poda, en pleno crecimiento vegetativo, en pre-floración y fructificación.
Trigo, Maíz, Alfalfa.			Aplicar durante el desarrollo vegetativo del cultivo, repetir un mínimo de 4 aplicaciones.



**CUIDADO
LIGERAMENTE TÓXICO**

