

GENERALIDADES:

TRASLOCADOR Plus, Es un fertilizante foliar líquido, formulado con una alta concentración de potasio y reforzado con Boro, Molibdeno y Magnesio.

TRASLOCADOR Plus, está formulado especialmente para traslocar los azúcares y almidones desde las hojas hacia los órganos cosechables de la planta, incrementando así los rendimientos y la calidad de los frutos.

TRASLOCADOR Plus, La formulación especial de este producto hace que las plantas no tengan un excesivo crecimiento vegetativo, lo cual proporciona un mayor desarrollo en los frutos, mejor color y sabor en la cosecha.

TRASLOCADOR Plus, Brinda una mayor tolerancia de la planta ante las sequías.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente utilizados excepto con aceites minerales, nitrato de calcio, productos de reacción muy ácida y/o alcalina, se recomienda realizar una prueba antes de mezclar.

ADVERTENCIA DE USO:

La empresa no se responsabiliza por el mal uso del producto así como por otros factores (preparación de las mezclas, aplicación, climatología, etc) que escapen de nuestro control que puedan intervenir en los malos resultados, siendo el usuario el responsable.

TRASLOCADOR PLUS

POTASIO + BORO MOLIBDENO + MAGNESIO

APERTURA DE YEMA FLORAL

COMPOSICIÓN QUÍMICA	p/v
Potasio	48.00 %
Boro	8.00 %
Molibdeno	2.00 %
Magnesio	5.00 %
Aminoácidos	20.00 %
Ácidos Policarboxílicos	5.00 %

Formulado por:



Distribuido por:



Contenido Neto: 1Lt

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

**CUIDADO
LIGERAMENTE TÓXICO**

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS L x 200 L	DOSIS L x ha	MOMENTO DE LA APLICACIÓN
Limón Sutil, Limón Tahití.	1	3 - 4	Primera aplicación: 1 mes antes de la cosecha. Segunda aplicación: Aplicar 20 días antes de la cosecha.
Cebolla, Páprika, Aji Amartillo, Tomate, Papa.	1	1 - 2	Primera aplicación: En el llenado de fruto para un mayor tamaño. Segunda aplicación: Aplicar 20 días antes de la cosecha.
Vid.	1	3 - 4	Primera aplicación: 40 a 45 días antes de la cosecha. Segunda aplicación: 10 a 15 días después de la primera aplicación
Palto, Manzana, Banano, Olivos	1	3 - 4	Primera aplicación: 1 mes antes de la cosecha. Segunda aplicación: Aplicar 20 días antes de la cosecha.
Cucurbitáceas: Sandía, Melón, Zapallo, Pepino.	1	1 - 2	Aplicar en el crecimiento del fruto.
Arroz, Maíz.	1	2 - 3	Para el llenado de grano.
Mango.	1	3 - 4	Aplicar para maduración de brotes vegetativos, en pre-floración y llenado de frutos
Espárrago.	1	3 - 4	Primera aplicación: 30 días antes del desbroce. Segunda aplicación: 10 días después de la primera aplicación.

AGITAR BIEN EL PRODUCTO ANTES DE USAR

