

FICHA TÉCNICA DEL SUPER FOSFORO

1.- GENERALIDADES:

a) Nombre Comercial	: SUPER FOSFORO
b) Ingrediente Activo	: Fósforo y Magnesio
c) Clase de Uso	: Fertilizante Agrícola
d) Formulación	: Suspensión Concentrada
e) Distribuidor	: SANTA CLARA AGROINSUMOS

2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fósforo (P_2O_5)	48.00 %
Magnesio	15.00 %
Extracto de Algas	10.00 %
Aminoácidos	25.00 %
Ácidos Policarboxílicos	2.00 %

3.- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

a) Aspecto	: Suspensión Concentrada
b) Color	: Verde
c) Olor	: Característico del Producto
d) Estabilidad en Almacén	: Estable durante largos periodos de Almacenamiento.
e) Densidad	: 1.10 – 1.20 g/cc a 25°C
f) Inflamabilidad	: No Inflamable
g) pH	: 4 -5

4.- TOXICOLOGÍA:

- a) Antídoto en caso de Intoxicaciones: No tiene antídoto específico, tratar al paciente sintomáticamente
- b) Precauciones para su Uso : Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lávelas con abundante agua, en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

5.- CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN:

- **SUPER FOSFORO**, Es un Biofertilizante con Fósforo, Magnesio y Aminoácidos, el cual es la mejor combinación para una mejor traslocación y eficiencia nutricional del fósforo en la planta. Es una fuente nutritiva de fósforo que no debe faltar en la etapa de enraizamiento, floración y formación de semillas en los frutos.
- **SUPER FOSFORO**, Se puede aplicar durante el desarrollo vegetativo, floración y fructificación de la planta, formando aminoácidos, enzimas y hormonas naturales.
- **SUPER FOSFORO**, Estimula el desarrollo radicular, floración, fructificación y mejora de la calidad de los frutos, forrajes y hortalizas
- **SUPER FOSFORO**, Es aplicable en cultivos de trasplante al prendimiento y en caducos al inicio del brotamiento.

6.- USOS Y DOSIS:

CULTIVOS	DOSIS L/200 Lt	MOMENTOS DE LA APLICACIÓN
Arroz.	1	Al inicio de macollamiento, hasta llenado del grano.
Mango.	1	Aplicar al inicio de instalación del cultivo, maduración de yemas y pre floración, repetir aplicaciones 3 a 4 veces por campaña.
Limón Sutíl, Limón Tahití, Mango, Banano.	1	Aplicar al inicio de instalación, repetir aplicaciones de 2 a 3 veces por campaña.
Algodón, Páprika, Maíz, Espárrago.	1	1° de la 2da a la 4ta semana. 2° 15 días después de la primera. 3° Inicio de floración. 4° Fruto a mitad de desarrollo.
Tomate, Camote, Apio, Ají, Cebolla, Pimiento, Lechuga, Acelga, Ajo, Col, Coliflor, Espinaca, Zanahoria, Poro, Betarraga, Nabo.	1	1° Inicio de floración. 2° Inicio de cuajado de frutos.
Zapallo, Sandía, Melón, Pepino.	1	1° Etapa inicial de desarrollo para enraizamiento. 2° Inicio de floración e inicio de cuajado de frutos.
Cítricos, Paltos, Manzanos, Piña, Plátano, Vid, Durazno	1	1° Inicio de floración. 2° Inicio de cuajado de frutos.

7.- COMPATIBILIDAD:

- Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente utilizados excepto con productos de reacción alcalina, se recomienda realizar una prueba antes de mezclar.

8.- INFORMACIÓN ADICIONAL:

- NOTA AL COMPRADOR:** La empresa no se responsabiliza por el mal uso del producto, así como por otros factores (preparación de las mezclas, aplicación, climatología, etc.) que escapen de nuestro control que puedan intervenir en los malos resultados, siendo el usuario el responsable.