

FICHA TÉCNICA DEL TRASLOCADOR Plus

1.- GENERALIDADES:

a) Nombre Comercial	: TRASLOCADOR Plus
b) Ingrediente Activo	: Potasio, Boro y Molibdeno
c) Clase de Uso	: Fertilizante Agrícola
d) Formulación	: Líquido
e) Distribuidor	: SANTA CLARA AGROINSUMOS

2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Potasio	48.00 %
Boro	8.00 %
Molibdeno	2.00 %
Magnesio	5.00 %
Aminoácidos	20.00 %
Ácidos Policarboxílicos	5.00 %

3.- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

a) Aspecto	: Líquido
b) Color	: Verde
c) Olor	: Característico del Producto
d) Estabilidad en Almacén	: Estable durante largos periodos de Almacenamiento.
e) Densidad	: 1.10 – 1.20 g/cc a 25°C
f) Inflamabilidad	: No Inflamable
g) pH	: 6 - 7

4.- TOXICOLOGÍA:

- a) Antídoto en caso de Intoxicaciones: No tiene antídoto específico, tratar al paciente sintomáticamente
- b) Precauciones para su Uso : Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lávelas con abundante agua, en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

5.- CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN:

- **TRASLOCADOR Plus**, Es un fertilizante foliar líquido, formulado con una alta concentración de potasio y reforzado con Boro, Molibdeno y Magnesio.
- **TRASLOCADOR Plus**, está formulado especialmente para traslocar los azúcares y almidones desde las hojas hacia los órganos cosechables de la planta, incrementando así los rendimientos y la calidad de los frutos.
- **TRASLOCADOR Plus**, La formulación especial de este producto hace que las plantas no tengan un excesivo crecimiento vegetativo, lo cual proporciona un mayor desarrollo en los frutos, mejor color y sabor en la cosecha.
- **TRASLOCADOR Plus**, Brinda una mayor tolerancia de la planta ante las sequías.

6.- USOS Y DOSIS:

CULTIVOS	DOSIS L x 200 L	DOSIS L x ha	MOMENTO DE LA APLICACIÓN
Limón Sutil, Limón Tahití.	1	3 - 4	Primera aplicación: 1 mes antes de la cosecha. Segunda aplicación: Aplicar 20 días antes de la cosecha.
Cebolla, Páprika, Ají Amartillo, Tomate, Papa.	1	1 - 2	Primera aplicación: En el llenado de fruto para un mayor tamaño. Segunda aplicación: Aplicar 20 días antes de la cosecha.
Vid.	1	3 - 4	Primera aplicación: 40 a 45 días antes de la cosecha. Segunda aplicación: 10 a 15 días después de la primera aplicación
Palto, Manzana, Banano, Olivos	1	3 - 4	Primera aplicación: 1 mes antes de la cosecha. Segunda aplicación: Aplicar 20 días antes de la cosecha.
Cucurbitáceas: Sandía, Melón, Zapallo, Pepino.	1	1 - 2	Aplicar en el crecimiento del fruto.
Arroz, Maíz.	1	2 - 3	Para el llenado de grano.
Mango.	1	3 - 4	Aplicar para maduración de brotes vegetativos, en pre-floración y llenado de frutos
Espárrago.	1	3 - 4	Primera aplicación: 30 días antes del desbroce. Segunda aplicación: 10 días después de la primera aplicación.

7.- COMPATIBILIDAD:

- Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente utilizados excepto con aceites minerales, nitrato de calcio, productos de reacción muy ácida y/o alcalina, se recomienda realizar una prueba antes de mezclar.

8.- INFORMACIÓN ADICIONAL:

- NOTA AL COMPRADOR:** La empresa no se responsabiliza por el mal uso del producto, así como por otros factores (preparación de las mezclas, aplicación, climatología, etc.) que escapan de nuestro control que puedan intervenir en los malos resultados, siendo el usuario el responsable.